钙与肥胖、胆固醇关系研究

李 雪

(哈尔滨医科大学营养与食品卫生教研室)

钙与肥胖、胆固醇关系研究

李 雪

哈尔滨医科大学 营养与食品卫生教研室

研究背景

钙 (Calcium) — 健康 (Health)

1992年中国居民膳食调查
Chinese dietary survey in 1992

405.4 mg << 800 mg

补钙、膳食钙摄入与慢性病之间的关系

补钙与肥胖的关系

Plos One

在任何年龄组中，补钙组与未补钙组的肥胖率无差异；
男性则分型，补钙与腹型肥胖、全身性肥胖均无显著关联。

图1 随着年龄增长，肥胖患病率的趋势

Figure 1. The trend of overall obesity and abdominal obesity in three curves with an increase in age strata

膳食钙摄入与肥胖的关系——动物实验

技术路线

低钙膳食动物模型

15周

对照组 (0.5%钙) | 低钙组 (0.3%钙) | 极低钙组 (0.15%钙)

收集生物样本 | 监测饮食、体重

数据处理分析

一、膳食钙摄入、补钙与肥胖的关系——人群横断面研究

Plos One

表1 膳食钙摄入与肥胖的相关性

Table 1. Associations between dietary calcium and obesity after multivariable adjustment

	Men Adjusted OR (95% CI)	Women Adjusted OR (95% CI)
Whole body obesity	1.09(0.98-1.22)	0.95(0.87-1.04)
Abdominal obesity I	1.02(0.92-1.13)	0.86(0.80-0.93)**
Abdominal obesity II	1.01(0.92-1.11)	0.92(0.86-0.99)*

I: WC ≥ 85cm for men or WC ≥ 80cm for women;
II: WHR ≥ 0.90 for men or WHR ≥ 0.85 for women.

女性膳食钙与BMI、WC、FM呈负相关，男性中无显著相关性。女性膳食钙增加是腹型肥胖的保护因素。

研究结果:

低钙干预对大鼠摄食无影响，对大鼠体重的影响有显著性。极低钙干预组大鼠体重显著增加。

Normal calcium(0.5%) Low calcium (0.30%) Very Low calcium (0.15%)

低钙干预的大鼠腹股沟脂肪细胞体积、脂肪组织重量显著增加。

7

低钙、低脂肪膳食，脂肪分解关键酶受到了抑制。

Journal of Nutritional Biochemistry 8

9

Ying Li et al. Journal of Nutrition 2011

10

CasR激活能够抑制脂肪细胞脂肪解——通过cAMP介导

维生素D能够通过CaSR，影响细胞内cAMP水平，并发挥脂肪分解作用

11

The Journal of Nutrition

低钙膳食引起肥胖的可能的机制：

The Journal of Nutrition 12

二、补钙与血清胆固醇的关系——人群横断面研究

图1 补钙是女性高胆固醇血症、MI的风险因素 (OR: 1.595 1.699)

Figure 1. Effects of CaS on serum TC and its related disease in cross-sectional study

年龄分层，钙剂补充是40-69岁女性高胆固醇血症、MI患病风险因素；

16

补钙与血清胆固醇的关系——人群横断面研究

图2 补钙对不同年龄段女性血清胆固醇水平的影响 (**P<0.05, **P<0.01)

Figure2. Effect of calcium supplementation on women serum cholesterol level in different age layers

17

18

三. 补钙与血清胆固醇的关系——人群干预性研究

随机双盲安慰剂对照法, 对绝经前、绝经后血脂紊乱的女性展开为期2年的干预性研究。
表1 基线、干预2年后, 血脂异常患者的各项测量指标
Table 1. Values of measured variables in dyslipidemic subjects at baseline and after 2 y*

Characteristic	Baseline		2 y		P	
	Placebo (n = 105)	Calcium supplementation (n = 176)	Placebo (n = 105)	Calcium supplementation (n = 176)		
Total cholesterol (mmol/L)	5.50 ± 0.88	5.56 ± 0.85	6.07	5.56 ± 0.84	5.87 ± 0.73	<0.001
Triglyceride (mmol/L)	1.70 ± 0.67	1.67 ± 0.65	0.96	1.73 ± 0.64	1.73 ± 0.65	0.681
HDL cholesterol (mmol/L)	1.22 ± 0.36	1.23 ± 0.34	0.80	1.23 ± 0.34	1.26 ± 0.34	0.006
LDL cholesterol (mmol/L)	3.27 ± 0.63	3.27 ± 0.60	0.46	3.09 ± 0.60	3.14 ± 0.67	0.152
CIMT (mm)	0.780 ± 0.10	0.754 ± 0.10	0.767	0.763 ± 0.11	0.773 ± 0.12	0.942

* All values are mean ± SD. Difference in measured variables at baseline between the 2 groups were analyzed by using the independent samples t-test. Difference in measured variables at 2 y between the 2 groups were analyzed by using ANCOVA, adjusted for their baseline values, respectively. *CIMT, carotid intima-media thickness.

对于绝经后女性, 补钙2年后TC显著高于安慰剂组; 绝经前女性TC没有显著变化

19

四. 补钙与血清胆固醇的关系——动物实验

20

补钙与血清胆固醇的关系——动物实验

表1 高钙干预增加了OVX血清TC水平, 降低了BA的分解代谢。
Table 1. Effects of calcium supplementation on serum cholesterol levels (n=10).

Serum Cholesterol (mmol/L)	Sham operation (Sham)		Ovariectomy (OVX)	
	Normal calcium (0.5%w/v)	Calcium Supplementation (1.5%w/v)	Normal calcium (0.5%w/v)	Calcium Supplementation (1.5%w/v)
TC	1.86 ± 0.20	1.76 ± 0.22	2.84 ± 0.22	3.27 ± 0.21**
HDL-C	1.13 ± 0.17	1.08 ± 0.15	1.83 ± 0.18	1.68 ± 0.15
LDL-C	0.73 ± 0.17	0.68 ± 0.26	1.22 ± 0.20	1.62 ± 0.21**

高钙干预后, OVX组大鼠TC, LDL水平显著升高; HDL水平无差异。此外, 高钙干预显著降低了OVX组胆, 粪便中BA含量; 增加了肝脏中TC水平

21

胆固醇代谢 Cholesterol Metabolism

22

五. 补钙与血清胆固醇的关系——体外研究

HepG2 Cell Line
Normal [Ca²⁺], 1.8 mM (Con)
High [Ca²⁺], 3.0 mM (Ca)
Estrogen + Con (E2, 100 nM)
E2 + Ca

Table 1. Effect of calcium supplementation on mRNA expression of cholesterol metabolic genes in the Sham and OVX groups

Gene	SHAM	LDLR	CYP7A1	CYP7A1	SREBP-1c	SREBP-1c	SHP	LRH-1	LRH-1	PCSK
Sham	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Normal Calcium	1.03	1.31	1.22	1.09	1.30	1.17	0.95	1.04	1.07	0.99
High Calcium	0.9	0.91	0.93	0.94	0.97	0.46	0.96	0.93	0.99	0.94
OVX	1.17	1.23	0.92	1.14	1.08	1.11	1.32	1.00	1.14	0.99
Normal Calcium	0.99	0.99	0.99	0.97	0.97	0.99	0.99	0.99	0.99	0.97
High Calcium	1.22	0.72	0.46	1.12	2.01	1.20	2.16	0.73	1.00	0.99
OVX	0.28	0.39	0.39	0.38	0.28	0.28	0.71	0.12	0.22	0.13

23

补钙与血清胆固醇的关系——体外研究

Table 2. Effect of CaI on mRNA expression of cholesterol metabolic genes with or without E2.

	Con	CaI	E2	E2+CaI
HMG-CoA Reductase	1	1.04 ± 0.23	1.10 ± 0.17	1.12 ± 0.17
CYP7A1	1	0.70 ± 0.06	1.10 ± 0.10	1.27 ± 0.30
SHP	1	1.41 ± 0.09	0.94 ± 0.12	0.90 ± 0.26
SREBP-1c	1	1.47 ± 0.12	0.75 ± 0.11	0.68 ± 0.15

24

补钙与血清胆固醇的关系——体外研究

Figure 3. Effect of E2 and [Ca²⁺]_i on the expression of cholesterol metabolic relative proteins.

Figure 4. Knockdown of SREBP-1c inhibits CaI-induced change in SHP and CYP7A1.

沉默SREBP-1C, 抑制了CaI介导的SHP增加和CYP7A1水平的降低; 但自有雌激素的条件下, 是否钙干预, 不影响SREBP-1C/SHP或CYP7A1的表达

25

补钙与血清胆固醇的关系——体外研究

26

图5 补钙对大鼠肝组织内cAMP水平的影响
Figure 5. Effect of calcium supplementation on cAMP level in rat liver

图6 雌二醇及细胞外钙对细胞内cAMP水平的影响
Figure 6. Effect of E2 and $[Ca^{2+}]_e$ on the level of cAMP in HepG2 cells.

图7 雌二醇及细胞外钙对细胞内胆固醇代谢相关蛋白水平的影响
Figure 7. Effect of E2 and $[Ca^{2+}]_e$ on the expression of cholesterol metabolic relative proteins.

CAS干预OVX肝内cAMP水平显著降低；缺乏雌激素的HepG2细胞，cal同样降低了cAMP水平，加入雌激素-CAMP，明显提高了cal介导的SREBP升高，和对SHP/CYP7A1的影响

补钙与血清胆固醇的关系——体外研究

International Journal of Cardiology

图13 沉默TRPC1引起cAMP升高，抑制Cal引起的SREBP-1c、SHP及CYP7A1的变化
Figure 13. Knockdown of TRPC1 inhibits Cal-induced change in the expression of SREBP-1c, SHP, and CYP7A1.

30

体外研究结果

图13 补钙对大鼠肝细胞内钙离子浓度的影响
Figure 13. Effect of calcium supplementation on $[Ca^{2+}]_i$ in rat hepatocytes.

图14 雌二醇及细胞外钙对细胞内钙离子浓度的影响
Figure 14. Effect of E2 and $[Ca^{2+}]_e$ on intracellular $[Ca^{2+}]_i$ in HepG2 cells

沉默SREBP-1c后，抑制了cal介导的SREBP水平增加-CYP7A1水平降低，在雌激素作用下，Ca²⁺对SREBP-1c/SHP/CYP7A1的影响无影响

27

机制图示
Proposed Mechanism

雌激素缺乏状态下，补钙对血清TC影响的调节机制
International Journal of Cardiology 31

补钙与血清胆固醇的关系——体外研究

28

图10 激活GPER抑制补钙引起的血清胆固醇水平上升

图11 沉默TRPC1抑制Cal引起的细胞内cAMP的变化

CaS导致OVX肝内cAMP水平显著升高(1.57倍)，雌激素可以取消CaS引起的肝内cAMP，并抑制cAMP水平降低

28

动物实验

对卵巢去除的补钙组大鼠尾静脉注射GPER激动剂G1
注射剂量为7 nmol/Kg/day (约为 100 nmol/L 血液浓度)
连续注射2周

33

补钙与血清胆固醇的关系——体外研究

29

图12 沉默TRPC1抑制Cal引起的细胞内钙的增加
Figure 12. Knockdown of TRPC1 inhibits Cal-induced change in $[Ca^{2+}]_i$

29

研究结果

图17 激活GPER后抑制了补钙引起的血清胆固醇水平上升
Figure 17. Activation of GPER inhibits calcium supplementation-induced increase of cholesterol in serum

34

学术意义

1. 明确低钙膳食对肥胖的作用
2. 阐明了作用机制
3. 明确了补钙对血清总胆固醇的作用
4. 阐明作用机制
5. 我国居民由于其膳食结构特点决定其为低钙膳食群体，通过大规模人群研究，探讨钙摄入与疾病的关系，为制定我国居民的膳食参考摄入量提出建议和提供科学依据。

35

Thank you!